

Листок-вкладыш – информация для пациента**Метформин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой****Метформин, 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: метформин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Метформин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Метформин.
3. Прием препарата Метформин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Метформин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Метформин, и для чего его применяют

Препарат Метформин содержит действующее вещество метформин, относящееся к группе средств для лечения сахарного диабета.

Показания к применению*Взрослые*

Препарат Метформин показан к применению у взрослых:

- при сахарном диабете 2 типа, особенно у пациентов с ожирением, при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок в качестве единственного препарата (монотерапии) или в сочетании с другими противодиабетическими препаратами для приема внутрь (пероральными гипогликемическими средствами) или инсулином;
- для профилактики сахарного диабета 2 типа у пациентов с предиабетом с дополнительными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа, у которых изменения образа жизни не позволили достичь оптимальных показателей сахара крови (адекватного гликемического контроля).

Дети

Препарат Метформин показан к применению у детей в возрасте от 10 лет при сахарном диабете 2 типа, особенно у пациентов с ожирением, при неэффективности диетотерапии и

физических нагрузок в качестве единственного препарата (монотерапии) или в сочетании с инсулином.

Способ действия препарата Метформин

Метформин улучшает чувствительность тканей к действию инсулина. Он не стимулирует выработку инсулина поджелудочной железой и не вызывает чрезмерного снижения уровня глюкозы в крови (гипогликемии), если только его не комбинировать с другими препаратами.

Он снижает всасывание глюкозы в кишечнике и подавляет образование глюкозы в печени.

Кроме этого, он оказывает благотворное действие на жировой обмен и на уровни триглицеридов (жиров) и холестерина в крови.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метформин

Противопоказания

Не применяйте препарат Метформин:

- если у Вас аллергия на метформин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас ацетон в моче (диабетический кетоацидоз) или очень высокий уровень сахара в крови с нарушением сознания (прекома или кома);
- если у Вас почечная недостаточность или нарушение функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
- если у Вас острое состояние, при котором может нарушиться функция почек: обезвоживание (при диарее, рвоте), тяжелые инфекционные заболевания, резкое снижение артериального давления (шок);
- если у Вас выраженные проявления острых или хронических заболеваний, которые могут приводить к развитию кислородного голодания тканей (тканевой гипоксии) (в том числе острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность с нестабильными показателями кровообращения (гемодинамики), дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда);
- если Вам предстоит обширная хирургическая операция или Вы получили травмы (в этом случае Вам может потребоваться временно перейти на лечение инсулином, см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»);
- если у Вас печеночная недостаточность, нарушение функции печени;
- если у Вас хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем;
- если Вы беременны (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности», «Беременность и грудное вскармливание»);
- если у Вас повышен или раньше повышался уровень молочной кислоты в крови (лактоацидоз);
- если в течение ближайших 48 часов Вам предстоит радиоизотопное или рентгенологическое исследование с введением йодсодержащего контрастного вещества или если Вам провели такое исследование менее 48 часов назад (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»);
- если Вы соблюдаете низкокалорийную диету (менее 1000 ккал/сут).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Метформин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Информация данного листка-вкладыша относится к Вашему ребенку, если препарат предназначен для него.

Сообщите лечащему врачу до начала применения препарата Метформин, если:

- Вы старше 60 лет и занимаетесь тяжелым физическим трудом;
- у Вас нарушена функция почек (клиренс креатинина 30–59 мл/мин);
- Вы беременны или кормите грудью.

Если что-либо из вышеуказанного относится к Вам, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом до начала применения препарата Метформин.

Врачу важно знать о любых имеющихся у Вас заболеваниях или состояниях, чтобы в полной мере оценить, насколько безопасно вводить Вам данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Риск лактоацидоза

Сообщите лечащему врачу, если после начала лечения препаратом Метформин:

- у Вас появились боль и судороги в мышцах, боль в животе, тошнота, рвота, упадок сил, снижение температуры тела, глубокое шумное дыхание (это могут быть признаки накопления молочной кислоты в организме – лактоацидоза).

Лактоацидоз – это тяжелое осложнение, которое требует лечения в стационаре. Если у Вас появились какие-либо из этих признаков, прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу. Риск лактоацидоза повышается, если у Вас плохие показатели уровня глюкозы в крови (декомпенсированный сахарный диабет) (особенно при появлении ацетона в моче), Вы подолгу голодаете, злоупотребляете алкоголем, у Вас нарушена функция печени или имеются другие состояния, которые приводят к кислородному голоданию (гипоксии) либо Вы принимаете другие препараты, вызывающие накопление молочной кислоты в организме.

Незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом для получения дальнейших указаний, если:

- Вы страдаете наследственным (генетическим) заболеванием, поражающим митохондрии (энергетические компоненты внутри клеток), например синдромом MELAS (митохондриальная энцефалопатия, миопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды) или наследуемым по материнской линии синдромом сахарного диабета и глухоты (MIDD);
- после начала приема метформина у Вас возникли какие-либо из этих симптомов: судороги, снижение умственных способностей, трудности в движении, симптомы, указывающие на повреждение нервов (например, боль или онемение), мигрень и глухота.

Хирургические вмешательства

Если Вам предстоит операция под общей, спинальной или эпидуральной анестезией, нужно прекратить прием препарата Метформин. Возобновить прием можно будет не раньше, чем через 48 часов после операции или после того, как Вам разрешат есть, и при условии, что у Вас не обнаружат нарушений функции почек.

Функция почек

Метформин выводится почками и при нарушении их функции может накапливаться в организме, поэтому прежде, чем назначать Вам препарат Метформин, Ваш врач назначит Вам

анализы для оценки функции почек и потом будет их повторять не реже 1 раза в год (или чаще, в зависимости от Вашей функции почек, возраста и сопутствующих состояний).

Если у Вас сильно снижена функция почек (клиренс креатинина составляет менее 30 мл/мин) препарат Метформин Вам противопоказан.

Особенно внимательно нужно следить за функцией почек, если Вы пожилой человек, а также при обезвоживании (например, из-за поноса или многократной рвоты), приеме препаратов для снижения артериального давления (особенно мочегонных) и нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как ибупрофен, нимесулид, целекоксиб и другие).

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность повышает риск нарушения функции почек и приводит к кислородному голоданию тканей (гипоксии).

Если у Вас сердечная недостаточность, во время приема препарата Метформин врач будет особенно тщательно следить за состоянием Вашего сердца и почек.

Если у Вас нестабильные показатели кровообращения (гемодинамики), препарат Метформин Вам противопоказан.

Применение йодсодержащих рентгеноконтрастных средств

Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод, могут вызвать нарушение функции почек, из-за которого метформин будет накапливаться в организме и в свою очередь вызывать накопление молочной кислоты.

Если Вам предстоит рентгенологическое исследование с использованием контрастов, содержащих йод, Вам необходимо прекратить прием препарата Метформин (в зависимости от функции почек препарат отменяют в день исследования или заранее, до 48 часов). Возобновить прием можно будет не ранее, чем через 48 часов после исследования при условии, что у Вас не обнаружат нарушения функции почек.

Применение во время беременности

Применение препарата во время беременности возможно только по рекомендациям лечащего врача с учетом отношения ожидаемой пользы для матери к возможному риску для плода и ребенка. Имеются ограниченные и неубедительные данные о влиянии метформина на долгосрочные результаты массы тела детей, подвергшихся воздействию метформина внутриутробно. Метформин не влияет на двигательное и социальное развитие у детей в возрасте до 4 лет, подвергшихся воздействию препарата во время беременности, хотя данные о долгосрочных результатах ограничены.

Другие меры предосторожности

Во время приема препарата Метформин необходимо правильно питаться, соблюдая рекомендации по питанию, которые Вам дал Ваш врач. Если у Вас избыточный вес, можно продолжать соблюдать низкокалорийную диету, но нужно избегать чрезмерных ограничений в еде (суточная калорийность Вашего рациона должна быть не менее 1000 ккал).

Рекомендуется регулярно проводить стандартные лабораторные анализы для контроля сахарного диабета.

При длительном приеме, особенно в высоких дозах, препарат Метформин может вызвать дефицит витамина В₁₂, необходимого для поддержания уровня гемоглобина и нормального функционирования нервной системы, поэтому рекомендуется ежегодно контролировать уровень витамина В₁₂ в сыворотке крови, особенно если у Вас есть другие факторы риска снижения уровня этого витамина.

Метформин сам по себе не вызывает чрезмерного снижения уровня глюкозы в крови (гипогликемии), однако гипогликемия может развиваться, если Вы помимо него получаете инсулин или другие препараты для лечения сахарного диабета.

Препарат Метформин используется не только для лечения сахарного диабета, но и для его профилактики. Его могут назначить Вам, если у Вас пограничные показатели сахара крови (предиабет) и есть другие факторы риска сахарного диабета, например:

- Ваш возраст ≥ 45 лет;
- Ваш индекс массы тела ≥ 30 кг/м²;
- у Вас повышался сахар в крови во время беременности;
- Ваши близкие родственники болеют сахарным диабетом;
- у Вас снижена концентрация «хорошего» холестерина ЛПВП (липопротеидов высокой плотности);
- у Вас повышенное артериальное давление.

Дети

Врач должен подтвердить диагноз сахарного диабета 2 типа, прежде чем назначать Вашему ребенку препарат Метформин.

В клинических исследованиях не было выявлено влияния метформина на рост и половое созревание. Однако ввиду отсутствия долгосрочных данных рекомендован тщательный контроль последующего влияния метформина на эти параметры у детей, особенно в период полового созревания. Наиболее тщательный контроль необходим детям в возрасте 10–12 лет.

Не давайте препарат Метформин Вашему ребенку, если ему еще не исполнилось 10 лет.

Другие препараты и препарат Метформин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Если Вам потребуется введение контрастного вещества, содержащего йод, например, для рентгеновского обследования, прекратите прием препарата Метформин за 48 часов до введения и на время прохождения обследования. Лечащий врач решит, когда Вам можно будет возобновить прием препарата Метформин.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете какие-либо препараты, перечисленные ниже, поскольку при их приеме нужно соблюдать осторожность:

- даназол (препарат, применяемый при некоторых гормонозависимых заболеваниях);
- хлорпромазин (препарат, применяемый для лечения некоторых психических заболеваний);
- глюкокортикостероиды (препараты, применяемые для лечения различных заболеваний, в том числе воспаления и бронхиальной астмы);
- диуретики (препараты, применяемые для увеличения выделения мочи);
- бета₂-адреномиметики в виде инъекций (препараты, применяемые для лечения бронхиальной астмы);
- гипотензивные средства (препараты, применяемые для снижения артериального давления);
- производные сульфонилмочевины, инсулин, акарбоза (препараты, применяемые для лечения сахарного диабета);
- салицилаты (препараты, применяемые для лечения боли и воспаления);
- препараты, применяемые для лечения некоторых заболеваний сердца (верапамил, нифедипин);
- катионные лекарственные средства (амилорид, дигоксин, морфин, прокаинамид, хинидин, хинин, ранитидин, триамтерен, триметоприм, ванкомицин);

- противозачаточные средства в виде таблеток;
- глюкагон (препарат, применяемый для лечения низкого уровня глюкозы в крови);
- гормоны щитовидной железы;
- женские половые гормоны (эстрогены);
- производные фенотиазина (препараты, применяемые для лечения некоторых психических заболеваний);
- никотиновая кислота;
- фенитоин (препарат, применяемый для лечения эпилепсии);
- препараты, применяемые для лечения туберкулеза (рифампицин, изониазид);
- циметидин (препарат, применяемый для лечения болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ));
- долутегравир (препарат, применяемый для лечения ВИЧ);
- ранолазин (средство для лечения стенокардии и острой боли в груди);
- даклатавир (препарат, применяемый для лечения гепатита С);
- препараты, применяемые для лечения некоторых видов рака (кризотиниб, олапариб, вандетаниб).

Препарат Метформин и алкоголь

При острой алкогольной интоксикации увеличивается риск развития лактоацидоза, особенно в случае:

- недостаточного питания, соблюдения низкокалорийной диеты;
- печеночной недостаточности.

Во время приема препарата следует избегать приема алкоголя и лекарственных средств, содержащих этанол.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

В случае необходимости применение препарата Метформин может быть рассмотрено во время беременности в качестве дополнения или альтернативы инсулину.

Грудное вскармливание

Препарат Метформин может проникать в грудное молоко. Если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата Метформин во время кормления грудью возможно только в том случае, если лечащий врач решит, что потенциальная польза применения препарата для матери выше, чем потенциальный риск для ребенка.

Фертильность

Исследования, проведенные на животных, показали отсутствие влияния метформина на фертильность (способность к зачатию).

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Метформин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Однако при его совместном применении с другими средствами для лечения сахарного диабета возможно чрезмерное снижение уровня глюкозы в крови (гипогликемия).

Тщательно контролируйте уровень глюкозы в крови и не нарушайте режим питания. Если Вы подвержены приступам гипогликемии, воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

3. Прием препарата Метформин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Врач подберет дозу препарата для Вас индивидуально, в зависимости от Вашего состояния, приема сопутствующих препаратов и реакции на лечение.

Монотерапия и комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемическими средствами при сахарном диабете 2 типа

Обычная начальная доза составляет 500 мг или 850 мг 2–3 раза в сутки.

Через каждые 10–15 дней рекомендуется корректировать дозу на основании результатов измерения концентрации глюкозы в плазме крови. Медленное увеличение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Поддерживающая доза препарата обычно составляет 1500–2000 мг/сут. Для уменьшения побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта суточную дозу следует разделить на 2–3 приема. Максимальная доза составляет 3000 мг/сут, разделенная на три приема.

Если Вы принимаете метформин в дозах 2000–3000 мг/сут, Ваш врач может перевести Вас на препарат метформина в дозировке 1000 мг. Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг/сут, разделенная на 3 приема.

Для перехода на препарат Метформин с других таблеток для лечения сахарного диабета необходимо прекратить прием Вашего прежнего препарата и начать прием препарата Метформин в дозе, назначенной Вашим врачом.

Комбинация с инсулином

Если Вы получаете лечение инсулином, обычная начальная доза препарата Метформин составляет 500 мг или 850 мг 2–3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина подбирают на основании концентрации глюкозы в крови.

Монотерапия при предиабете

Обычная доза составляет 1000–1700 мг в сутки, разделенная на 2 приема.

Рекомендуется регулярно контролировать уровень глюкозы в крови для оценки необходимости дальнейшего применения препарата.

Пациенты с нарушением функции почек

Если у Вас нарушена функция почек, Вам может потребоваться снижение дозы препарата Метформин в зависимости от значения клиренса креатинина. Ваш врач будет регулярно определять у Вас клиренс креатинина, и, если он упадет ниже 30 мл/мин, препарат Метформин нужно будет немедленно отменить.

Пациенты пожилого возраста

У пожилых людей нередко снижается функция почек, поэтому при приеме препарата Метформин ее нужно регулярно контролировать (2–4 раза в год).

Применение у детей и подростков

У детей с 10-летнего возраста препарат Метформин может применяться как в качестве единственного средства, так и в сочетании с инсулином. Обычная начальная доза составляет 500 мг или 850 мг 1 раз в сутки после или во время приема пищи. Через 10–15 дней дозу необходимо скорректировать на основании концентрации глюкозы в крови. Максимальная суточная доза составляет 2000 мг, разделенная на 2–3 приема.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Таблетки проглатывают целиком, запивая водой. Таблетки нужно принимать во время еды или после нее.

Продолжительность лечения

Препарат Метформин принимается длительно. Важно принимать препарат каждый день, пока лечащий врач не изменит лечение.

Если Вы приняли препарата Метформин больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком большую дозу препарата Метформин, это, скорее всего, не вызовет чрезмерного снижения уровня глюкозы, однако может привести к накоплению молочной кислоты в крови (лактоацидозу). Он может проявляться болью и судорогами в мышцах; болью в животе; тошнотой и рвотой; упадком сил; снижением температуры тела; глубоким шумным дыханием.

Если Вы приняли слишком большое количество таблеток, обратитесь к Вашему врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Врач назначит лечение и при необходимости Вы будете находиться под постоянным наблюдением медицинского персонала до нормализации состояния.

Если Вы забыли принять препарат Метформин

Если Вы забыли принять препарат, не беспокойтесь. Просто примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Метформин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. Не прекращайте применение препарата Метформин без предварительной консультации с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Метформин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения:

Очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000

- признаков лактоацидоза (рвота, боль в животе, боль и судороги в мышцах, упадок сил, снижение температуры тела, глубокое шумное дыхание, в тяжелых случаях — тяжелое угнетение сознания (кома)).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Метформин

Очень часто – могут возникать более чем у 1 человека из 10

- тошнота;
- рвота;
- понос (диарея);
- боль в животе;
- отсутствие аппетита.

Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10

- недостаточность витамина В₁₂;
- изменение вкусовых ощущений (дисгевзия).

Очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000

- нарушение показателей функции печени;
- гепатит;
- кожные реакции, такие как эритема, зуд, сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Метформин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Метформин содержит

Действующим веществом является метформин.

Метформин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 500 мг метформина (в виде гидрохлорида).

Метформин, 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 850 мг метформина (в виде гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: повидон К-30, магния стеарат, гипромеллоза, тальк, титана диоксид, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000).

Внешний вид препарата Метформин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Метформин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета.

Метформин, 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Капсуловидные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой. По 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

По 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой. По 2 или 4 контурных ячейковых упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой. По 3 контурных ячейковых упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ДЖИЭФСИ»

354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Демократическая, 54А, помещение 1

Телефон: +7 989 836-11-33

Электронная почта: safety@gphc.ru

Производитель

Российская Федерация

ООО «Интерфарма»

300004, Тульская обл., г. Тула, Торховский проезд, д. 8

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ДЖИЭФСИ»

354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Демократическая, 54А, помещение 1

Телефон: +7 989 836-11-33

Электронная почта: safety@gphc.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <https://grls.rosminzdrav.ru>.